

## 人体の構造と機能及び疾病

問題 1 標準的な身体の成長と発達に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 生後2か月までに、首がすわる。
- 2 生後3か月までに、座位保持ができる。
- 3 生後6か月までに、乳歯が生えそろう。
- 4 生後6か月までに、大泉門は閉鎖する。
- 5 生後18か月までに、一人で歩くことができる。

問題 2 人体の各器官に関する次の記述のうち、解剖学的に正常なものを1つ選びなさい。

- 1 頸椎は12個の骨で構成される。
- 2 頸動脈は体表から触知できる。
- 3 大腸は空腸と回腸に分けられる。
- 4 右肺は2つの肺葉からなる。
- 5 胃は横隔膜の上にある。

問題 3 世界保健機関(WHO)の活動に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 アルマ・アタ宣言では、プライマリヘルスケアの重要性が示された。
- 2 リハビリテーションという言葉は初めて用いた。
- 3 憲章前文の中で、健康とは、身体的、精神的、社会的、政治的に良好な状態であると定義した。
- 4 国際疾病分類であるICIDHを策定した。
- 5 健康寿命とは、健康上の問題で制限されることなく仕事ができる期間と定義した。

問題 4 高齢者に多くみられる病態に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 脱水になると、脈拍が少なくなる。
- 2 老人性難聴では、低音領域から聴力が低下する。
- 3 甲状腺機能低下症は、浮腫の原因となる。
- 4 栄養過多は、褥瘡の発生要因になる。
- 5 葉酸が不足すると、味覚障害が生じる。

問題 5 肢体不自由となる疾患に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 デュシェンヌ型筋ジストロフィーでは、呼吸困難が初発症状である。
- 2 筋萎縮性側索硬化症(A L S)は、運動失調を主体とする変性疾患である。
- 3 脊髄損傷では、排尿障害が起こりやすい。
- 4 分娩時の高酸素血症は、脳性麻痺の原因となる。
- 5 遺伝性の脊髄小脳変性症では、歩行障害は起こらない。

問題 6 精神疾患の診断・統計マニュアル(D S M - 5)において、「統合失調症」と診断するための5つの症状に含まれているものはどれか。正しいものを1つ選びなさい。

- 1 まとまりのない発語
- 2 観念奔逸
- 3 強迫行為
- 4 抑うつ気分
- 5 不眠または過眠

問題 7 廃用症候群に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 関節拘縮は起こりにくい。
- 2 筋の萎縮は起こりにくい。
- 3 高齢者では起こりにくい。
- 4 起立性低血圧が起こりやすい。
- 5 急性期リハビリテーションで離床を早期から行うことで起こりやすい。