

障害の理解

問題 87 ノーマライゼーション(normalization)の理念を8つの原理にまとめた人物として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 ニイリエ(Nirje, B.)
- 2 バンク-ミケルセン(Bank-Mikkelsen, N.)
- 3 ヴォルフエンスベルガー(Wolfensberger, W.)
- 4 ロバーツ(Roberts, E.)
- 5 ソロモン(Solomon, B.)

問題 88 世界保健機関(WHO)によるリハビリテーションの定義で、「利き手の交換」が該当するものとして、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 職業的リハビリテーション
- 2 医学的リハビリテーション
- 3 経済的リハビリテーション
- 4 教育的リハビリテーション
- 5 社会的リハビリテーション

問題 89 ^{ついまひ} 対麻痺を生じる疾患として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 筋萎縮性側索硬化症 (amyotrophic lateral sclerosis : A L S)
- 2 腰髄損傷 (lumbar spinal cord injury)
- 3 悪性関節リウマチ (malignant rheumatoid arthritis)
- 4 パーキンソン病 (Parkinson disease)
- 5 脊髄小脳変性症 (spinocerebellar degeneration)

問題 90 統合失調症 (schizophrenia) の特徴的な症状として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 妄想
- 2 ^{そう} 躁うつ
- 3 強迫観念
- 4 振戦せん妄
- 5 見捨てられ不安

問題 91 知的障害の特徴に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 成人期に出現する。
- 2 てんかん (epilepsy) の合併率が高い。
- 3 有病率は女性が高い。
- 4 重度・最重度が大半を占める。
- 5 遺伝性の障害が大半を占める。

問題 92 発達障害者が一般就労に向けて利用するサービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 行動援護
- 2 就労定着支援
- 3 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援
- 4 同行援護
- 5 就労継続支援B型

問題 93 網膜色素変性症(retinitis pigmentosa)の初期の症状として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 硝子体出血
- 2 口内炎
- 3 眼圧上昇
- 4 夜盲
- 5 水晶体の白濁

問題 94 上田敏による障害受容のステージ理論の5つの心理過程のうち、最初の段階として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 受容期
- 2 否定期
- 3 ショック期
- 4 混乱期
- 5 解決への努力期

問題 95 関節リウマチ(rheumatoid arthritis)の人の日常生活上の留意点として、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 いすは低いものを使う。
- 2 膝を曲げて寝る。
- 3 かばんの持ち手を手で握る。
- 4 ドアの取っ手は丸いものを使う。
- 5 身体を洗うときはループ付きタオルを使う。

問題 96 右利きのCさん(73歳, 男性)は脳梗塞(cerebral infarction)を発症して、回復期リハビリテーション病棟^{ひだりかたまひ}に入院中である。左片麻痺のため、歩行は困難である。他の患者とも交流せず、病室に閉じこもりがちであったため、多職種チームによるカンファレンス(conference)が開かれた。

現時点のCさんへの対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 利き手の交換
- 2 階段昇降訓練
- 3 義足の製作
- 4 プッシュアップ訓練
- 5 心理カウンセリング